



Diagnostico mediante pruebas de laboratorio

Existen cuatro reglas generales que recordar acerca de las pruebas:

1. Ninguna prueba es perfecta. A veces, las personas sanas tienen pruebas cuyos resultados son anormales, y las personas con artritis pueden tener pruebas con resultados normales.
2. Las pruebas no determinan el diagnóstico o el tratamiento. Antes de realizar cualquier prueba, su médico debería tener una buena noción de lo que está afectando a las articulaciones. Las pruebas ayudarán a reducir cualquier incertidumbre pendiente.
3. En general, las pruebas diagnósticas no se deben repetir una vez que se ha confirmado el diagnóstico. (Quizás se repitan las pruebas para verificar la eficacia del medicamento o los efectos colaterales).
4. El proceso diagnóstico se realiza sobre la base de la historia clínica y el examen físico, las pruebas son secundarias.

Puntos importantes que recordar.

- Es muy importante que el médico llegue al diagnóstico correcto ya que existen diferentes tipos de artritis y, frecuentemente, el tratamiento varía de acuerdo con el tipo de artritis.
- El diagnóstico y tratamiento precoz a menudo pueden ayudar a controlar los síntomas y a retardar o prevenir el daño en las áreas afectadas.
- Un médico o reumatólogo que tenga conocimientos y experiencia en la artritis y enfermedades asociadas generalmente podrá realizar el diagnóstico.
- En la artritis, no siempre es simple o fácil llegar al diagnóstico correcto, y quizás lleve tiempo e implique muchas consultas al médico.
- En los primeros estadios, algunos tipos de artritis pueden asemejarse entre sí y causar síntomas similares. Del mismo modo, algunos tipos de artritis pueden parecerse a otras enfermedades.
- Es probable que el médico desee observar sus síntomas durante un tiempo para determinar si usted sufre de artritis, y si así fuera, para diagnosticar específicamente el tipo de artritis que usted padece.